同色のデフテラが融合した場合、患者のバイタルを減少 させ、周囲に腫瘍を生み出す。この腫瘍は、通常時にデフテ ラが生み出す腫瘍と同じで、黒と白の2色が存在し、黒はバ イタルへのダメージが大きいが増殖しにくく、白は増殖しや すいがバイタルへのダメージは小さいという特徴がある。 そのため、発生直後は黒を優先してレーザーで焼却し、数が 多いなら白を優先的に焼却するのがいい。

「手順]

00ドレーン

融合したデフテラの組織液を吸引

@ \ XX ❸ / ピンセット 硬質化したデフテラを切り離す 切り離したデフテラをトレイへ運ぶ


人工膜を切除痕に乗せる

6 ▶ ヒールゼリー 人工膜を定着させる

ー / レーザー 腫瘍を焼却



この術式で最も優先すべ きは、デフテラの生み出 す腫瘍の処置。いち早く -ザーで焼却しよう。



バイタルは低下するが、 デフテラの前方にヒール ゼリーを塗ると移動方向 を変えることができる。



組織液の吸引を3度行 なうと硬質化へ。模様 が吸引ごとに変化する ので見分けも可能だ。



同色で融合した場合 は、組織液の吸引ができ ない。腫瘍の処置やバ イタルの回復をしよう。

サヴァト幼体







評価ポイント



臓器内に潜み、仲間と融合することで成長を遂げる病原体。 ギルスの一種であるサヴァトは、幼体(小サヴァト)の状態で臓 器を突き破って出現する。この小サヴァトは、レーザー照射で 焼却可能だが、一度に発生する数が多く、対処するのが厄介。 ただし、臓器から飛び出す瞬間は 1ヵ所から扇状に広がるの で、広がるまえにまとめて焼却してしまうのが最良だ。

小サヴァトたちは一定時間動き回ると、仲間を呼び寄せて 成体(青サヴァト)になる。この青サヴァトは耐久力がある のでレーザー照射を続けて行なわなければ焼却できない。 さらに生存中は患者のバイタル上限を減らす。そのため、 青サヴァトに成長させないことが重要となる。

[手順]

0 4 レーザー

小サヴァトにダメージを与える

② 今 針と糸

出現時に発生した傷口を縫う



小サヴァトの出現時に 発成する傷口の処置が 評価対象になる。評価 の基準は裂傷と同じだ。



青サヴァトが発生すると バイタル上限値が低下 てしまう。素早く倒し

術式を把握することができたら、エピソードの攻略に挑戦しよう。 クリアに役立つ情

評価ランクは気にせず、まずはクリア

手術のなかには、患部を素早く処置する場面も存在する が、最初のうちは落ち着いて1つずつ患部の処置を行ない、 極力ミスをしないことを心がけて術式を進めていこう。助 手や仲間の助言も聞き漏らさず、困難な状況になったら超執 刀を惜しまずに活用し、まずはそのエピソードを最後まで進 めて手術の流れを覚えるといい。流れを把握したら、同じ器 具で処理できるところをまとめて治療したり、スペシャルボ ーナスを狙って術式を進めるといいだろう。高ランククリア やハイスコアを狙うのはそれからでも問題ない。

報やハイスコアを目指すためのワンポイントテクニックを紹介する。



助手のエレナは、ミスをし た際にその原因を教えて くれる。同じミスを繰り返

つねにバイタル回復のことを考える

患部の治療中はバイタルが少しずつ下がる。また操作ミ スをしたり、スティグマが傷を発生させたりすると、バイタル は大きく下がってしまう。そのため次の傷が発生するまえ や、スティグマが画面から消えた瞬間など、たとえバイタル が上限に近い状態にあっても、とにかく隙を見てはバイタル を回復させるようにしよう。また、手術をより安全に進める なら、開創処置を行なうまえにバイタルを上限値まで回復さ せておくといいだろう。なお、メスやレーザーで患部を処置 したときもバイタルは下がることも覚えておこう。



腫瘍を切り離したり、内 出血を切開するなど、メス で患部を処置したときも ベイタルは下がる。

連続して使えない器具

レーザー、注射、ヒールゼリー、メスの4つの器具は、連続 で使える限度が設定されている。そのため限度まで使い続 けると、ペナルティとして一定時間その器具を使えなくなっ てしまう。限度へどのくらい近づいているかは、パレットに あるアイコンの色の変化(緑→黄→赤→アイコン消滅で使 用不可能)で確認することができる。これら4つの器具は、 術式を進めるにあたっては頻繁に使用する重要なものなの で、アイコンが赤色になったら、できるだけ休みを入れるよう にして、使用不可能にならないように注意を払いたい。



レーザーはスティグマを 焼却するために必須の 器具だ。そのため使用 不可能にもなりやすい。